

Bamlanivimab

Hinweise zur Zwischenlagerung

Bamlanivimab 700mg Durchstechflaschen


- Durchstechflaschen sind bis zum Gebrauch im Kühlschrank bei 2°C bis 8°C zu lagern.
- Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren, um das Arzneimittel vor Licht zu schützen.
- Das Arzneimittel darf NICHT EINFRIEREN und NICHT GESCHÜTTELT werden.

Die Bamlanivimab-Durchstechflaschen sollten **vor der Zubereitung** aus dem Kühlschrank entnommen und **etwa 20 Minuten auf Raumtemperatur** gebracht werden (nicht direkter Hitze aussetzen!).

Die zubereitete Infusion ist unmittelbar anzuwenden und darf nicht gelagert werden.

Bitte vollständig ausfüllen – dient als Herstellungsdocumentation!

Name Patient:	
Verwendetes Fertigarzneimittel:	Bamlanivimab 700mg/20ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Chargenbezeichnung:	
Zubereitungsdatum und Uhrzeit:	
Zubereitender (Name, Unterschrift):	
Verabreichungsdatum und Uhrzeit:	
Verordnender / freigebender Arzt (Name, Unterschrift):	
Anmerkung	Bitte machen Sie sich vor der Zubereitung mit der Fachinformation von Bamlanivimab vertraut



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Herstellung sorgfältig durch!

Material-Set mit:

1x Bamlanivimab 700mg

1x NaCl 0,9%-Beutel 250ml

2x Spritze 20ml

1x Spritze 50ml (mit aufgesetzter Kanüle)

3x Kanüle (18G)

3x Kombi-Verschlussstopfen

1x Infusionsbesteck



Hinweise zur Zubereitung

1. Prüfen Sie Bamlanivimab visuell auf Partikel und Verfärbungen. Die Lösung ist klar bis leicht opaleszent und farblos bis leicht gelblich bzw. bräunlich.
2. Fläschchen vorsichtig per Hand schwenken. **Nicht schütteln!**
3. Entfernen Sie die Verschlusskappe am weißen Injektionsport des NaCl-Beutels.
4. **Entnehmen** Sie mit Hilfe der 50ml-Spritze (Kanüle entfernen und durch eine 18G-Kanüle ersetzen) und einer 20ml-Spritze **70ml NaCl-Lösung** aus dem 250ml NaCl-Beutel. Verschließen Sie die Spritzen mit einem Kombi-Verschlussstopfen und werfen diese.
5. Ziehen Sie **20ml Bamlanivimab** auf (**Cave: Druckausgleich! Schaumbildung vermeiden!**) und spritzen es langsam zu den verbliebenen ca. 180ml NaCl-Lösung in den Beutel.
6. Wenden Sie den Beutel vorsichtig, um ihn zu mischen. **Nicht schütteln!**
7. Schließen Sie das Infusionsbesteck nach Entfernen der Verschlusskappe an den **blauen** Infusionsport des Beutels an.
8. Verabreichen Sie verdünnte Lösung als intravenöse Infusion mit einer **Infusionsrate von 200ml/h** über **mind. 60 Minuten**. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Füllschwankungen der vorgefüllten Infusionsbeutel u.U. nicht exakt die deklarierte Menge enthalten ist. **Der Beutel sollte in jedem Fall komplett durchlaufen.**
9. Spülen Sie anschließend die Infusionsleitung mit mind. 25-50ml NaCl um zu verhindern, dass relevante Wirkstoffmengen in der Infusionsleitung verbleiben.

gemäß SPC Bamlanivimab: Stand Januar 2021