



Casirivimab und Imdevimab

Hinweise zur Zwischenlagerung

Casirivimab 1332mg und Imdevimab 1332mg Durchstechflaschen

- Durchstechflaschen sind bis zum Gebrauch im Kühlschrank bei 2°C bis 8°C zu lagern.
- Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren, um das Arzneimittel vor Licht zu schützen.
- Das Arzneimittel darf NICHT EINFRIEREN und NICHT GESCHÜTTELT werden.

Die Casirivimab und Imdevimab-Durchstechflaschen sollten **vor der Zubereitung** aus dem Kühlschrank entnommen und **etwa 20 Minuten auf Raumtemperatur** gebracht werden (nicht direkter Hitze aussetzen!).

Die zubereitete Infusion ist unmittelbar anzuwenden und darf nicht gelagert werden.

Bitte vollständig ausfüllen – dient als Herstellungsdocumentation!

| | |
|--|---|
| Name Patient: | |
| Verwendetes Fertigarzneimittel: | Casirivimab 1332mg pro 11ml (120mg/ml) und Imdevimab 1332mg pro 11ml (120mg/ml) Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung mit je 1200mg Casirivimab und Imdevimab |
| Chargenbezeichnung: | |
| Zubereitungsdatum und Uhrzeit: | |
| Zubereitender (Name, Unterschrift): | |
| Verabreichungsdatum und Uhrzeit: | |
| Verordnender / freigebender Arzt (Name, Unterschrift): | |
| Anmerkung | Bitte machen Sie sich vor der Zubereitung mit der Fachinformation von Casirivimab und Imdevimab vertraut |

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Herstellung sorgfältig durch!

Material-Set mit:

1x Casirivimab 1332mg (120mg/ml)

1x Imdevimab 1332mg (120mg/ml)

1x NaCl 0,9%-Beutel 250ml

2x Spritze 10ml

2x Kanüle (18G)

1x Infusionsbesteck

1x Inline-Filter



Hinweise zur Zubereitung

1. Prüfen Sie die Ampullen visuell auf Partikel und Verfärbungen. Die Lösung ist klar bis leicht opaleszent und farblos bis blassgelb.
2. Fläschchen vorsichtig per Hand schwenken. **Nicht schütteln!**
3. Entfernen Sie die Verschlusskappe am weißen Injektionsport des NaCl-Beutels.
4. Desinfizieren Sie den Gummistopfen der Vials (Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!).
5. Ziehen Sie mit zwei separaten Spritzen **10ml Casirivimab und 10ml Imdevimab** auf (**Cave: Druckausgleich! Schaumbildung vermeiden!**) und spritzen beides langsam in den 250ml NaCl 0,9% -Beutel.
6. Wenden Sie den Beutel vorsichtig, um ihn zu mischen. **Nicht schütteln!**
7. Schließen Sie das Infusionsbesteck nach Entfernen der Verschlusskappe an den **blauen** Infusionsport des Beutels an.
8. Verabreichen Sie die **verdünnte** Lösung als intravenöse Infusion über den beigepackten 0,2µm-Inline-Filter mit einer **Infusionsrate von 250ml/h** über **mind. 60 Minuten**. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Füllschwankungen der vorbefüllten Infusionsbeutel u.U. nicht exakt die deklarierte Menge enthalten ist.
Der Beutel sollte in jedem Fall komplett durchlaufen.
9. Spülen Sie anschließend die Infusionsleitung mit mind. 25-50ml NaCl 0,9% um zu verhindern, dass relevante Wirkstoffmengen in der Infusionsleitung verbleiben.

gemäß SPC Casirivimab und Imdevimab: Stand Januar 2021